

ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期										
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上			
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化			①	②	③					④(注1)															
肺炎球菌(PCV13)	不活化			①	②	③					④												(注2)			
B型肝炎	ユニバーサル			①	②					③													(注3)			
	母子感染予防	①	②							③																
ロタウイルス	1価			①	②					(注4)																
	5価			①	②	③				(注5)																
4種混合(DPT-IPV)	不活化			①	②					③	④(注6)						(7.5歳まで)									
3種混合(DPT)	不活化			①	②					③	④(注6)						(7.5歳まで)									
2種混合(DT)	不活化																					⑤(注7)	⑥11-12歳(注8)			
ポリオ(IPV)	不活化			①	②					③	④(注6)						(7.5歳まで)						11歳①	12歳		
BCG	生									①																
麻疹・風疹混合(MR)	生											①					②(注10)									
水痘	生										①		②											(注11)		
おたふくかぜ	生										①						②(注12)									
日本脳炎	不活化													①	③		(7.5歳まで)						④9-12歳			
インフルエンザ	不活化																							毎年(10、11月などに)①②	13歳より①	
ヒトパピローマウイルス(HPV)	不活化																					(注13)	小6	中1①②③(注14)	中2～高1	(注15)

定期接種の推奨期間
 定期接種の接種可能な期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の接種可能な期間
 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
 健康保険での接種時期