



ワクチン		種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期																					
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上														
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②							③														(注1)											
	母子感染予防		①	②										③																								
ロタウイルス	1価	生			①	②			(注2)																													
	5価				①	②	③			(注3)																												
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)		不活化			①	②	③												④												(注4)							
5種混合 (DPT-IPV-Hib)		不活化			①	②	③												④										7.5歳まで		15歳未満まで使用可能							
3種混合 (DPT)		不活化																											①		② 11-12歳	(注5)(注6)						
2種混合 (DT)		不活化																												① 11歳	12歳							
ポリオ (IPV)		不活化																													①	(注7)						
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化			①	②	③												④												(注8)							
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合		不活化			①	②	③												④											7.5歳まで		15歳未満まで使用可能						
BCG		生												①																								
麻疹・風疹混合 (MR)		生																													②	(注9)						
水痘		生																														(注10)						
おたふくかぜ		生																														②	(注11)					
日本脳炎		不活化																														①	②	③	7.5歳まで	④ 9-12歳		
不活化インフルエンザ		不活化																																生後6か月から接種可能	毎年 (10、11月などに) ① ②	13歳以上①		
経鼻弱毒生インフルエンザ		生																																2歳以上～19歳未満に 毎年 (10月、11月などに) ① 点鼻				
新型コロナ		mRNA																																製剤により使用できる年齢が異なる				
ヒトパピローマウイルス (HPV)	9価	不活化																															(注12)	小6	中1①②	(注13)	中2～高1相当	(注14)
	2価・4価	不活化																																(注12)	小6	中1①②③ (注13)	中2～高1相当	(注14)
ワクチン		種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上														

- 定期接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の推奨期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
- 健康保険での接種時期